

- vol. 6, p. 538. NOUV. DEHAMEL, vol. 7, p. 47, et *Tab.* 11, fig. 2. *Non* RAU *Enum. Ros.* p. 99.
- R. (*Canina*) var. β . DC. *Fl. franc.* 3716. POIR. *Ency.* 6, 288, var. β . Vulg. *Rosier des haies à fl. roses*. Sous-variété à fleurs semi-doubles.
- β . R. *Sepium parviflora*. BAST. *Suppl.* p. 31. Petit arbrisseau qui ne s'élève guères qu'à un pied et demi. Environs d'Angers. Vulg. *Rosier des haies à petites fleurs*.
- γ . R. *Sepium alba*. DESV. *l. c.* p. 116, var. α .
- R. (*Agræstis*.) GM. *Bad.* 2, p. 416. SAVI. *Fl. Pis.* 1, p. 475. Les folioles sont plus arrondies que dans les autres variétés. Vulg. *Rosier des haies à fl. blanches*.
- δ . R. *Sepium myrtifolia*. (N.)
- R. (*Myrtifolia*.) HALLER FIL. R. (*Canina myrtifolia*.) DU P. *Gymn. Ros.* 1, n° 6, in THY. R. CAND., p. 13. Folioles petites, elliptiques très-luisantes en-dessus, assez semblables aux feuilles du myrte. Fleurs d'un blanc-lavé-de-rose, souvent solitaires. Vulg. *Rosier des haies à feuilles de myrte*.
- ϵ . R. *Sepium olei-carpa*. (N.)
- R. *Olei-carpa*. TH. inédit. Trouvée aux environs de Paris par M. THUILLIER, qui a bien voulu nous la communiquer. C'est une variété remarquable par les nervures très-saillantes des folioles, et ses fruits qui offrent la forme exacte d'une olive moyenne. Vulg. *Rosier des haies à fruits d'olivier*.
- ζ . R. *Sepium ambigua*. DESV. *l. c.* p. 116. Les pédoncules sont quelquefois un peu hispides dans cette variété. Vulg. *Rosier des haies équivoque*.
- η . R. *Sepium latifolia, foliolis magnis, remotis, grandt-dentatis, basi acutis, apice subrotundis; floribus ex albo-roseis; cyma trifida*. (N.)
- Folioles, trois ou quatre fois plus grandes que dans la précédente; chaque paire, très-écartée l'une de l'autre, se développe sur un pétiole souvent long de quatre pouces. Cette variété nous a été envoyée par M. LE GRAND, qui l'a découverte sur la lisière de la forêt de Chantilly, à Saint-Firmin, aux environs de l'habitation de M. LECOSTE. Vulg. *Rosier des haies à grandes feuilles*.

Les Rosiers de cette série sont communs dans toute la France. Quelques auteurs ont prétendu que le *Rosa Sepium* n'était qu'une modification du *Rosa Rubiginosa*; cependant celui-ci s'en éloigne par ses tiges moins élançées, par ses folioles presque rondes, un peu pubescentes en-dessus, et couvertes en-dessous, comme sur les bordures de glandes visqueuses, entremêlées de poils, souvent, couleur de rouille; mais, sur-tout, par la forte odeur de pomme de reinette que donnent ces mêmes folioles froissées dans les doigts, caractère propre à tous les Rosiers du groupe des *Rubiginosæ*, et qu'on ne trouve pas dans celui des *Sepienses*.